

Hipertansif Hastalarda ACE İnhibitör Tedavisine Eklenen Statin

Sayın Editör
Anadolu Kardiyoloji Dergisi,

Derginizin 2003;3:4;331-7 sayısında Dr. Z.Danaoğlu ve arkadaşlarına ait "Hipertansif hastalarda ACE inhibitör tedavisine eklenen statin.." isimli makaleyi okudum.

Araştırmacılar, yöntem bölümünde dışlama kriterlerinden bahsederlerken trigliserid için <150 mg/dl kabul ettiklerini bildirmektedirler. Tablo 2'nin incelenmesinden de görülebileceği gibi trigliserid seviyeleri birinci grup için 153 ± 73 mg/dl , ikinci grup için 136 ± 69 mg/dl verilmiştir. Standart sapmaları bu kadar yüksek olan ortalamaları 150 mg/dl'yi geçen vakaların teker teker değerlerinin, dışlama kriteri olan 150 mg/dl'nin çok üstünde olması gerekir. Bu konuyu acaba yazarlar nasıl izah etmektedirler.

Saygılarımla,

**Dr Hakan Sekitmen
Aydın**


Yazarın Yanıtı

Sayın Editör
Anadolu Kardiyoloji Dergisi,

Derginizin 2003;3:4;331-7 sayısında yayınlanan "Hipertansif hastalarda ACE İnhibitör tedavisine eklenen statin.." isimli makalemizde yöntemler bölümünde trigliserid düzeyleri sınırı yanlışlıkla " <150 mg/dl" olarak yazılmış olup doğrusu " <250 mg/dl"dir. Bu hatayı farkedene değerli meslektaşımıza dikkatlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Dr. Zülfikar Danaoğlu



Artvin '90 sonları